

## Zawiesiny z antybiotykami - aromaty

| Substancja czynna                        | Nazwy handlowe        | Aromat                                   |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Amoksycylina                             | <i>Amotaks</i>        | truskawka i malina                       |
|                                          | <i>Hiconcil</i>       | cytryna, brzoskwinia-morela i pomarańcza |
|                                          | <i>Ospamox</i>        | cytryna, brzoskwinia-morela i pomarańcza |
| Amoksycylina<br>z kwasem<br>klawulanowym | <i>Amoksiklav</i>     | dzika wiśnia i cytryna                   |
|                                          | <i>Amoksiklav ES</i>  | malina, pomarańcza i karmel              |
|                                          | <i>Amylan ES</i>      | truskawka                                |
|                                          | <i>Auglavin PPH</i>   | truskawka                                |
|                                          | <i>Augmentin ES</i>   | truskawka                                |
|                                          | <i>Augmentin MFF</i>  | pomarańcza i malina                      |
|                                          | <i>Hiconcil Combi</i> | malina, pomarańcza i karmel              |
|                                          | <i>Taromentin</i>     | pomarańcza, cytryna i tropik             |
| Azytromycyna                             | <i>AzitroLEK</i>      | śmietankowo-karmelowy                    |
|                                          | <i>Azycyna</i>        | wiśnia, banan, wanilia                   |
|                                          | <i>Sumamed</i>        | wiśnia, banan, wanilia                   |
|                                          | <i>Sumamed Forte</i>  | wiśnia, banan, wanilia                   |
| Cefadroksyl                              | <i>Duracef</i>        | cytryna, truskawka, malina               |
| Cefaklor                                 | <i>Ceclor</i>         | truskawka                                |
| Cefuroksym                               | <i>Ceroxim</i>        | tutti frutti i peppermint                |
|                                          | <i>Zinnat</i>         | tutti frutti                             |
| Klarytromycyna                           | <i>Klabax EC</i>      | tutti frutti i peppermint                |
|                                          | <i>Klabax</i>         | tutti frutti i peppermint                |
|                                          | <i>Klacid</i>         | owocowy poncz „Fruit Punch”              |
|                                          | <i>Lekoklar</i>       | owocowy poncz                            |
| Penicylina<br>fenoksymetylowa            | <i>Ospen 750</i>      | tutti frutti                             |

**Dodatkowe uwagi:**

- Po podaniu dziecku zawiesiny *Azycyna*, należy natychmiast podać do popicia herbatę lub sok, aby zawiesina nie pozostała w ustach.
- W razie potrzeby *Zinnat* w postaci zawiesiny w butelce wielodawkowej można bezpośrednio przed przyjęciem rozcieńczać zimnymi sokami owocowymi lub napojami mlecznymi.
- Prawidłowo przygotowana zawiesina *Klacid* może zawierać drobne, nierozpuszczone „grudki”, które przypominają kryształki cukru. Wynika to z właściwości leku i nie powinno budzić niepokoju.